



Les "NACO"s

Cas clinique: Patient sous NACO avec un anévrisme de l'aorte abdominale.

Dr Eric ROUSSEL
Urgences/SMUR – CH Lucien Hussenel - Vienne

- Homme ; 82 ans
- Vit à domicile avec son épouse ; autonome
- Antécédents : HTA ; IC ; coronaropathie ; ACFA
- Traitement : SELOKEN ; CORDARONE ; INEGY ; COVERSYL ; LASILIX ; PREVISCAN
- Traitement AVK difficile à équilibrer
- Début avril 2013, découverte TDM d'un AAA sous-rénal de 8,5 cm de diamètre (bilan de masse abdominale)

Que proposez vous à ce patient

- 1 - Hospitalisation pour chirurgie urgente (dans la semaine)
- 2 - Chirurgie semi-urgente (à 1 mois)
- 3 - Surveillance à 6 mois (nouveau TDM)

Une chirurgie est programmée à 1 mois; que proposez-vous concernant le traitement anticoagulant?

1 - Arrêt pur et simple en attendant l'intervention

2 - Poursuite des AVK

3 - Relais AVK-NACO

4 - HBPM

5 - HNF

Il est proposé un relais AVK-NACO.

Le 28/04/2013 à 7h30, violente douleur abdominale + syncope.

A la PEC SMUR : TA=76/51 ; FC=120 ; CGS=15 ;

pâleur + sueurs ++ ; 4

défense abdominale avec masse pulsatile
sous-ombilicale.

Que demandez-vous pour votre arrivée au déchocage ?

- 1 - TDM abdominal en urgence absolue
- 2 - FAST-écho
- 3 - 4 CRG + 4 PFC
- 4 - PPSB 50 UI/kg (avec une dose en réserve)
- 5 - CP + fibrinogène
- 6 - Chirurgien présent à l'arrivée au déchocage

- Déchocage à 10h25 ; TA=50/35 ; G6 ; FC=120 ; 35°1 ; SaO2=80% ; Hcue=9
- IOT sous ISR ; entretien Rémifentanyl + Nimbex
- Equipement, biologie pré-op et passage rapide au BO
- 250 ml Kanokad ; 1g Exacyl puis relais PSE ; 10 CGR + 10 PFC + 1 CPA
- 3g Clottagen ; 5g CaCl2
- Noradrénaline (12 mg/h) + adrénaline (5 mg/h)
- Clampage endoluminal aorte par ballon d'occlusion
- Mise à plat-greffe aorto-aortique par laparotomie xypho-pubienne
- Transfert en réa (Nad à 7 mg/h + Ad à 2,8 mg/h) : TA=8/6 ; FC=135 ; 32°3
- Pas de diurèse ; mise en route d'une dialyse
- Bio post-op et nouvelle antagonisation : 90 ml Kanokad
- Bradycardie et ACR ; DC à 18h50

NACO et AAA

Heure	pH	Lact	Ca ⁺⁺	Hb	Plaq	TCA	TP	AntiXa	Fib
10h45	7,33	6	1,07	94	190	36	30	1,05	3,8
12h30	7,03	7,3	1,28	80					
14h45	7,08	11,5	0,87	101	94				
16h30	7,13	9,1	1,15	126	104	51	31	0,59	2,4
18h30	7,07	11	0,89	125	49	50	45	0,36	