

## Crise convulsive fébrile chez l'enfant

**ATCD** : Vaccins, ATCD neuro familiaux et personnes : développement neuro-psychomoteur, épilepsie

**Histoire et Etiologie de la fièvre** : voyage (paludisme), diarrhée glairo-sanglante (SHU, Shigelle), tolérance de la fièvre (cyanose, frissons), métabolisme

**Examen clinique complet** : recherche syndrome méningé, signe de focalisation

**Diagnostic différentiel** : spasme du sanglot, myoclonie, malaise, frissons, intoxication

- Crise convulsive
- Température > 38° C

Si défaillance CV → voir référentiel sepsis sévère

Crise convulsive en cours ?

OUI

Cf référentiel crise d'épilepsie inaugurale non fébrile chez l'enfant **p40**

Résolue

### Crise convulsive fébrile simple

- > 6 mois et < 5 ans
- Développement normal
- Ø d'ATCD d'épilepsie
- Crise généralisée tonique ou tonico-clonique
- Durée brève <15 min, résolution spontanément favorable
- Une seule crise au cours d'un épisode fébrile
- Examen neurologique au décours normal
- Absence d'argument clinique pour intoxication ou anomalie

### Crise fébrile complexe

- Crise focale ou déficit postcritique
- Et/ou** durée prolongée (> 15 min)
- Et/ou** répétée (> 1 crise dans les 24h)

### Autre crise

- < 6 mois ou > 5 ans
- et/ou** ATCD neurologiques ou anomalie du développement psychomoteur

